


## Надевание\*

### 1 Подбор размера канюли

Выберите назальную канюлю соответствующего размера. Вокруг каждой канюли должен быть видимый просвет. Таблицу размеров на следующей странице следует использовать исключительно в качестве рекомендаций.

**Вокруг канюль должен быть зазор\***



XS	S	M	L	XL	XXL
OJR410	OJR412	OJR414	OJR416	OJR418	OJR520

### 2 Подготовка кожи

Подготовьте кожу пациента, следуя правилам лечебного заведения.

### 3 Подсоединение к источнику газа

Подсоедините канюлю к источнику газа.

СОВЕТ. Приблизьте руку к назальным канюлям, чтобы проверить выход потока газа из канюль.

### 4 Удаление первых частей подложки F&P Wigglepad™ 2

Удалите первые части подложек с подушечек Wigglepads 2, не касаясь клейкого слоя.

### 5 Установка канюли


Ведите канюлю в ноздри.

Убедитесь в том, что мост канюли расположен рядом с носом, но не касается носовой перегородки.

ЗАПРЕЩЕНО растягивать канюль во время применения. Приклейте подушечки Wigglepads 2 к щекам пациента.

### 6 Фиксация канюли

Удалите вторые части подложек и приклейте подушечки Wigglepads 2 к щекам пациента.



\* ВАЖНО! Обязательно обращайтесь к инструкциям пользователя, поставляемым вместе с изделием, где приведены полные указания по настройке, предупреждения, меры предосторожности и противопоказания.

## Отсоединение канюли

### 1 Поместите кончик пальца

Поместите кончик пальца на внешний край подушечки Wigglepads 2 и аккуратно снимите канюль с подушечки Wigglepads 2.



## Удаление и замена подушечек Wigglepads 2

### 1 Поднимите край подушечки

Поднимите край подушечки Wigglepads 2. При помощи влажной ткани протрите кожу пациента и нижнюю часть подушечки Wigglepads 2, аккуратно отслаивая подушечку от лица пациента.



### 2 Приклеивание

Прикрепите сменные подушечки Wigglepads 2 к канюлю, удалите первые части подложек и приклейте подушечки Wigglepads 2 к щекам пациента.




### 3 Снятие

Снимите вторые части подложки и приклейте подушечки к щекам пациента.

## Информация о размерах

### ПРИМЕЧАНИЕ.

Носовые зубцы не должны герметично прилегать к ноздрям. Вокруг каждой канюли должен быть видимый просвет. Вес пациента должен использоваться только в качестве ориентира.



wkGA = недели с момента зачатия; mo = месяцы; yr = годы

\* Данные о массе тела основаны на валидационном исследовании изделий компании F&P.

\*\* Данные о возрасте получены путем корреляции с данными о массе тела на основе сочетания кривых роста Фентона, ВОЗ и CDC (США).

610839 REV B © 2025 Fisher & Paykel Healthcare Limited